



Clozapine Plus Werkgroep



Behandeling van therapieresistente
positieve, negatieve en cognitieve stoornissen

Jubileumcongres
Utrecht
9 februari 2023

Dr. Selene Veerman
Psychiater
GGZ Noord-Holland Noord

Visie


- Zelfregie met een gezonde en actieve leefstijl en zo min mogelijk medicatie staan centraal

GGZ NHN


- PhD thesis Pharmacological Interventions in Clozapine-Refractory Schizophrenia (UvA)
- Voorzitter geneesmiddelencommissie
- Leadexpert psychose en wetenschappelijk onderzoek

Landelijke activiteiten


- Bestuurslid Commissie Medicatiebeleid NVvP: esketamine neusspray, medicatie voor Oekraïne)
- Bestuurslid Clozapine Plus Werkgroep
- Modules APO-opleiding (basiskennis, psychiatrie in de wijk en psychotische stoornissen)
- Werkgroep multidisciplinaire richtlijn psychose




Antipsychotische Monotherapie (oraal en langwerkend) in chronische fase




Positieve symptomen





Primaire negatieve symptomen




Corrigeer voor
secundaire
negatieve
symptomen




Cognitie




Sedatie



Bewezen behandelopties






Clozapine Clozapine Clozapine
Clozapine Clozapine Clozapine
Clozapine Clozapine Clozapine

Clozapine

informatie voor
patiënten, familieleden en betrokkenen



Clozapineresistente schizofrenie



Walker e.a. 2004; Conley & Kelly, 2001; Buckley e.a. 2001; Kontaxakis e.a. 2005; Agid e.a. 2010







**Onvoldoende
respons**




Voordelen van clozapine




Clozapineresistente positieve symptomen

Onvoldoende respons wanneer clozapine:

1. boven spiegel van 350 – 400 ug/l ingesteld
2. intolerantie bij therapeutische spiegel
3. voldoende lang (8 weken)




Bewezen behandelopties




Clozapineresistente negatieve symptomen

Onvoldoende respons wanneer clozapine:


1. boven spiegel van 350 – 400 ug/l ingesteld
2. Intolerantie bij therapeutische spiegel
3. zonder sedatie
4. 6 tot 12 maanden



Bewezen behandelopties




Bewezen behandelopties



Aanbevelingen

- Vroegdetectie: PQ16 + CAARMS
- AP: adequate dosering + behandelduur (TDM)
- Bij acute psychose combi met benzodiazepines
- Clozapine bij therapieresistentie en agressie
- Bewezen farmacologische interventies: hoogstens een matig effect
- Bijwerkingen bepalend voor additietherapie
- Polyfarmacie: min. 12 weken, staken na uitblijven effect na 6 maanden
- CGT beter implementeren
- ECT vaker toepassen bij therapieresistente positieve symptomen
- Minder nadruk op medicatie en meer aandacht voor gezonde, actieve en creatieve leefstijl
- Aanbod van aerobe training en yoga, muziektherapie, sociaal-cognitieve training en CRT onder professionele begeleiding



CGT,
sporten of yoga.

Ik hoor nog steeds stemmen.
Is hier dan niets tegen te doen?



Clozapine,
toevoeging van topiramaat
of valproïnezuur.
Tenslotte ECT.



Ik kan niet meer denken.
Wat kan mij nog helpen,
dokter?



Sporten, yoga,
neurocognitieve training,
sociaal-cognitieve training,
clozapine en memantine.

Clozapine,
toevoeging van een
antidepressivum, aripiprazol,
topiramaat of memantine.



Hoe krijgen we zijn
sprank weer terug?



Ik voel me leeg
en ik heb geen zin of
energie meer om nog
iets leuks te doen.

Zelf muziek maken,
sporten of yoga.



