


Bloedprikken bij clozapinegebruik

U gebruikt al enige tijd het medicijn clozapine. Clozapine werkt vaak goed bij een psychose of bewegingsstoornissen. Clozapine heeft als bijwerking dat het een tekort aan witte bloedcellen **kan** veroorzaken. Dit noemen we een 'agranulocytose'. Een tekort aan witte bloedcellen kan ernstige gevolgen hebben.

Als u een tekort hebt aan witte bloedcellen en u loopt een infectie op (bijvoorbeeld verkoudheid, keelpijn of koorts), doet de afweer van uw lichaam het soms niet. Dit kan levensbedreigend zijn. Een tekort aan witte bloedcellen komt gelukkig maar heel weinig voor. In Europa krijgt slechts 1 op de 200 mensen die clozapine gebruiken dit.

Als u clozapine gebruikt, neemt de kans op een tekort aan witte bloedcellen na 18 weken heel erg af (zie het plaatje hieronder). Een gevaarlijk tekort aan witte bloedcellen komt na de eerste 18 weken niet vaker voor dan bij andere medicijnen tegen psychoses.



U heeft de eerste 18 weken van het clozapinegebruik elke week uw bloed laten controleren. Bij uw controles zijn tot nu geen aanwijzingen voor een tekort aan witte bloedcellen naar voren gekomen.

De overheid zegt dat na 18 weken nog steeds elke maand bloedcontroles nodig zijn. Een tekort aan witte bloedcellen wordt dan sneller ontdekt, en er is minder kans op ernstige gevolgen.

U weet nu welke risico's er zijn als u de aantallen witte bloedcellen minder vaak laat controleren. Nadat u deze informatie heeft gekregen, gaf u aan dat u niet elke maand uw bloed wilt laten controleren. Geeft u hieronder aan hoe vaak u uw bloed **wel** wilt laten controleren.

Verklaring cliënt:

Ik heb besloten dat ik na de eerste 18 weken niet maandelijks mijn bloed wil laten controleren. Ik snap dat dan het risico op te laat ontdekken van een agranulocytose groter is. Toch wil ik minder vaak gecontroleerd worden:

- Ik wil na de eerste 18 weken clozapinegebruik **1 x per 3 maanden** een bloedcontrole
- Ik wil na de eerste 18 weken clozapinegebruik **1 x per half jaar** een bloedcontrole
- Ik wil na de eerste 18 weken clozapinegebruik **1 x per jaar** een bloedcontrole

- Ik wil na de eerste 6 maanden clozapinegebruik **1 x per 3 maanden** een bloedcontrole
- Ik wil na de eerste 6 maanden clozapinegebruik **1 x per half jaar** een bloedcontrole
- Ik wil na de eerste 6 maanden clozapinegebruik **1 x per jaar** een bloedcontrole

- Ik wil na de eerste 12 maanden clozapinegebruik **1 x per 3 maanden** een bloedcontrole
- Ik wil na de eerste 12 maanden clozapinegebruik **1 x per half jaar** een bloedcontrole
- Ik wil na de eerste 12 maanden clozapinegebruik **1 x per jaar** een bloedcontrole

- Ik wil **geen** bloedcontrole op vaste momenten, maar ik laat **bij griepachtige verschijnselen en koorts** mijn bloed de eerstvolgende werkdag controleren. Ik neem dan contact op met degene die mij clozapine heeft voorgeschreven (of diens waarnemer als hij/zij er niet is)

Datum:

Naam cliënt:

Handtekening cliënt:

Verklaring behandelaar:

Ik heb cliënt gezien en de risico's uitgelegd. Cliënt snapt* welke risico's dit kan opleveren en blijft bij zijn wens om de aangeraden frequentie van bloedonderzoek te verminderen:

Datum:

Naam behandelaar:

Handtekening behandelaar:

*Voor beoordeling van de wilsbekwaamheid zie:

<https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/verdiepen/begrippen-2/wilsbekwaamheid.htm>

<https://www.goedvertegenwoordigd.nl/wp-content/uploads/sites/14/2013/12/Stappenplan-wilsbekwaamheid.pdf>